




2. fractura cu  
siliacert

fractura q. fit i legatura me of  
fium ex apertu sic dicit. it m pns ossis q. focus e ossis. m  
tus totu e revoluta r fion ligamto e ossin giza. it  
fractui q. dula e r mobil r max e unilne eo q. p m d  
legu p m u. u. y. p x p s p m d m p u m f i a n t m u n o  
m g r p x r a o s i p p u e m e f a c t a  
a p u t d m s e a t . h u c e f u  
d i f f i n i t q u o f i t d i f f a n t a .  
q. soluat. **P** p x p u t u r f o  
**P** m e s n o i e i p x p u m a d i  
o m b l y o f f i l y q. r e f e c t u r . r .  
q u o n a m e s e u a e d o y f i t a d

fractura q. fit i legatura me of  
fium ex apertu sic dicit. it m pns ossis q. focus e ossis. m  
tus totu e revoluta r fion ligamto e ossin giza. it  
fractui q. dula e r mobil r max e unilne eo q. p m d  
legu p m u. u. y. p x p s p m d m p u m f i a n t m u n o  
m g r p x r a o s i p p u e m e f a c t a  
a p u t d m s e a t . h u c e f u  
d i f f i n i t q u o f i t d i f f a n t a .  
q. soluat. **P** p x p u t u r f o  
**P** m e s n o i e i p x p u m a d i  
o m b l y o f f i l y q. r e f e c t u r . r .  
q u o n a m e s e u a e d o y f i t a d

fractura q. fit i legatura me of  
fium ex apertu sic dicit. it m pns ossis q. focus e ossis. m  
tus totu e revoluta r fion ligamto e ossin giza. it  
fractui q. dula e r mobil r max e unilne eo q. p m d  
legu p m u. u. y. p x p s p m d m p u m f i a n t m u n o  
m g r p x r a o s i p p u e m e f a c t a  
a p u t d m s e a t . h u c e f u  
d i f f i n i t q u o f i t d i f f a n t a .  
q. soluat. **P** p x p u t u r f o  
**P** m e s n o i e i p x p u m a d i  
o m b l y o f f i l y q. r e f e c t u r . r .  
q u o n a m e s e u a e d o y f i t a d

Summa de exemplis et similitudinibus  
in trig. tractat. arismetice practice  
q. de aliquibus. tractat. arismetice  
speculative.

C. J. - 80. . . .






Adverte: pmo attende sensum litteralem / 2º perfig-  
 nificationes vocabulorū hīc applica. ad aliquam mora-  
 literam. 3º ad spiritualitatem. Et in predictis appli-  
 ca omnes fig. suas et proprietates vocabulorū Et semper  
 adverte ad immediatam nonam Et secundariam et  
 materiam subiectam ex qm diuide et diuembra  
 materiam per clarum sct et in narranda per pul-  
 cras periphas et vocabula vt bene in auribus audientū  
 imaginari: nō sis prolixus et distectus in represen-  
 tatione. et meliora et pulchra in fine narrationis  
 vel sermonis. qz quiblibet diuina melius memo-  
 rie commendantur. semper procura nomina et bonū  
 intellectum hīc ad bonos et bonos mores / tam  
 aīe qz corporis / imando et exhortando qd dicitur














Tractatus Arithmethice Pra-  
ctice qui dicitur Al-  
gorismus.



Jehan Lambert

Venūdantur Parrhisiis a Jo-  
hanne Lamberto eiusdem ciuitatis Bibliopola: in signo viui Claudij pro-  
pe Collegij Locreti edem cōmorante.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
PRESS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
PRESS



# Tractatus Arithmetice pra-

enice qui dicitur Algorithmus.



Quia vniuersis bonarū artium ⁊ philosophiē studiosis: mathematicas esse psequēdas: ac earūdem limina ingredi volē-  
tibus ab arithmetica esse ordiendū (eo q̄ hec aliarū notissi-  
ma ceteris additū parat) Aristoteles in posteriorib⁹ assue-  
rat: idcirco vt etiam aliorū vtilitati studiū referantur no-  
stra: de ipsa arte numerādi: prout ille qui stellarū numerat  
multitudine quicq̄ omnia certa numeri ratione formauit benedic⁹ deus  
dignabitur nos illustrare: breue compendū ex p̄decessorū libris colli-  
gens. Arithmetica igitur est scientia numeri eiusq̄ specierū ac proprie-  
tatū et proportionū speculatiua. Vnde ⁊ arithmos quod est numerus di-  
cta est. Eius alia pars est theozica/ alia vero practica. theozica numerū ⁊  
partes et passionē eius per se cōsiderat. practica autē numeros ad nego-  
ciationes humanas applicat. ⁊ hec nomine proprio dicitur Algorithmus.  
vnde cuiuslibet numeri scripti ostendit valorē. omnē etiam numerū cōce-  
ptum vel prolātū docet recte per litteras scriptas representare. Itē pra-  
ctice de qua hic intēdimus tres sunt partes: prima de numeris integris.  
secūda de fractiōibus numerozū. tertia de curiosis et difficilib⁹ mercato-  
rū questionib⁹. Et rursus fractiones numerozū sunt duplexes: quedā vul-  
gares: vt medietas vel tertia vel quarta pars vnius rei. alie vero sunt fra-  
ctiones phisice. scū vna res in sexaginta partes equales diuidit⁹ que par-  
tes dicūtur minuta: et iterū quelibet illarū partiū in alias sexaginta par-  
tes equales que dicūtur secūda. et rursus quēcūq̄ earū in alias sexaginta  
ta que dicūtur tertia sicq̄ in infinitū vt cōmuniter practica in astrologia  
Solum autē algorismū de numeris integris et de fractionib⁹ phisicis/ vt  
curiosa negociosis dimittam⁹: necessaria vero philosophiē studiūbus  
tradamus hoc opusculo claudemus: hoc etiam accedente q̄ principia to-  
tius artis numerarie hic comprehendemus: vnde hīs habitis quis per se  
ipsum alias partes practice arithmetice ⁊ sine hīs nemo facile intelliget.  
Præsentē vero tractatū bina diuisione secabimus. primū de algorismo in  
numeris integris. deinde in fractionib⁹ phisicis et hī erunt duo tractat⁹.  
quoz primū erit de numeratione et de suis speciebus seu modis numerā-  
di iterū sex capitulis distinguem⁹. Dicturi primo quid numerus/ quid nu-  
meratio/ et quid sit numerare/ et quomodo oportet numerare. in secundo  
de additione et quid sit addere vel sumare et de practica eius. in tertio de  
subtractione et quid sit subtrahere vel restare. in quarto de multiplicatio-  
ne. in quinto de diuisione. in sexto demū de radicum numerozū adinuentio-  
ne. Quasdam autem minus principales species: vt sunt duplatio dimidia-  
tio et p̄gressio ad has principales reducemus nec oportebit distincta ca-  
pitula de illis tradere.

# Tractatus

Capitulum primum de numero et numeratione.



Primum capitulum quattuor habet partes. Prima ostendit quid sit numerus et quid numeratio. Est igitur numerus unitatum collectio vel acervus ex unitatibus profusus. Numeratio est numerum propositi scripta vel vocalis vel mentalis perceptibilis expressio. Unde et numerare est numerum propositum scripto vel voce vel conceptu perceptibili representare. Secunda pars dat figuras seu characteres quibus utimur in hac arte: et sunt decem sequentes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. Quarum prima valet unum: secunda duo: tertia tria et sic predece versus ad extremam que cifra vocatur et illa per se nihil significat: sed facit alias sequentes plus significare ut postea patebit. Tertia pars distinguit docet quomodo propositum numerum per suas figuras vel loca aut limites et in quo loco debeat poni quilibet numerus et quilibet figura et quantum valeat in suo loco. Ubi notandum quod omnis numerus citra decem appellatur unitas vel digitus: ut unus: duo: tres. et c. versus ad novem inclusive. et omnis numerus denarius vel terminatus ad decem infra centum et vocatur dena vel articulus: ut sunt isti decem viginti triginta quadraginta et c. versus ad nonaginta inclusive: et omnis numerus centenarius infra mille dicitur centena: ut centum ducenta trecenta et c. versus ad noningenta: et omnis numerus millenarius citra decem milia appellatur millena: ut mille: duo millia: tria millia et c. versus ad novem millia: et sic poteris procedere in infinitum. ut patet in hac regula. Unitas: dena: centena: millena: decies millena: centies millena: millies millena: quod vulgare dicitur cuento: decies cuento: centies cuento: milies cuento: decies milles: centies milles: millies cuento: quod vulgare dicitur millon: decies millon: centies millon: millies millon: decies milles millon: centies milles millon: et sic procedendo quousque sit possibile nominare.

Sciendum etiam quod omnis numerus tot loca vel limites habet quot figuras cum quibus scribitur: et illa que est versus dexteram appellatur primus locus vel limes: sequens illam ad sinistram dicitur secundus limes: et iterum succedens dicitur tertius limes versus ad extremam versus sinistram et illa dicitur ultimus limes aut locus: ut patet in hoc exemplo. 3496. ubi primus locus est figura 6. secundus est figura 9. tertius figura 4. quartus figura 3. similiter in quolibet alio numero: et huius causa est quia hec ars inventa est apud arabes que scribunt a dextera ad sinistram eundo sicut et hebrei hijs habitis vicinis quod omnis numerus qui dicitur unitas vel digitus. citra decem debet scribi in primo loco: et omnis numerus dena vel articulus in secundo loco vel limite. et omnis numerus centena in tertio loco: et sic procedendo ut patuit in regula superius dicta. Et nota quod omnes numeri qui sunt inter duas decenas sunt compositi ex dena et ex unitate: et ideo non possunt scribi in uno limite vel loco: sed una pars eius scribitur in primo loco: et alia pars in secundo: ut sunt isti: undecim: duo decim: tredecim: et ceteri versus ad decem novem inclusive. Item isti viginti unum: viginti duo: viginti octo: et ceteri: unde si deberet scribi decem et octo: dividetur in duas partes et octo scriberetur in primo loco: decem vero in secundo: sic. 18. similiter facies in isto numero viginti quinque sic. 25. Advertendum est etiam quod omnes numeri qui debent poni in secundo vel tertio vel quarto loco

Digitus

Articulus

Digitus

Articulus



# Arithme. Practice Algorismi.

scribuntur cum eisdem litteris vel characteribus cū quibus scribūt numeri ponendi in primo loco: quia non habemus nisi illos decem characteres ad scribendum omnem numerū. et inde est q̄ quorquot sunt vnitates/ totidem sunt vnae/et totidem centene/et totidem millene &c. et cuilibet vnitati respondet vna vena et vna centena & vna millena que eade littera scribi debent sicut illa vnitates: vt vni respondent decem centū et mille &c. que similiter scribunt cum littera prima. s. i. et duobus respondent viginti ducenta/et duo millia &c. et scribunt cū secunda littera. s. z. et tribus respondent triginta/trecenta/tria millia &c. et scribuntur cū tertia littera. s. 3. et ita in alijs. Unde sicut vnitates procedunt ab vno vsq; ad nouem: ita vnae procedunt a decem vsq; ad nonaginta: et centene a centum vsq; ad nouingenta: et millene a mille vsq; ad nouem milia &c. et propter hoc cōsuevit dici q̄ quelibet illarum figurarum si primo loco scribatur seipsam semel significat. et si in secundo loco scribatur significat seipsam decies et si in tertio loco significat se centies. et in quarto millesies. vt patet in exemplo premisso. 3. 4. 9. 6 vbi prima littera. scilicet. 3. significat sex solummodo. secunda significat nonaginta. scilicet decies nouem. et tertia significat quattuorcenta. sex centies quattuor. et vltima significat tria milia. sex milies tria. Item nota q̄ quilibz locus sequēs valet decies plusq; locus ipium immediate pcedens in quolibet nūero. Nam dena valet decies plusq; vnitates et cetera decies plusq; vena: et millena decies plusq; cetera: & ita de alijs.

**¶** Quarta pars huius capituli docet qualiter quicq; numerus propositus debeat scribi. et qualiter cuiuscūq; numeri scripti valor debeat voce explicari. Cum igitur volueris numerum aliquē scribere attende diligenter si ibi nominetur aliqua de illis nouem vnitatibus & scribe eam in primo loco per suam figuram: & si nulla de illis in tali numero nominetur pone cifram in primo loco vt nō remaneat omnino vacuus: quia tunc alie figure sequētes nō valerent decē vel centum si ibi oīno nihil esset. deinde cōsidera si in numero tibi proposito nominetur aliqua de nouē venis & scribe eam in secundo loco per figuram illius vnitatis cui correspondet illa vena: vt decem per .i. viginti per .z. triginta per .3. &c. et si nulla vena nominetur pone ibi cifram vt dixi ne ille locus perdat. similiter facies in centenis & in millemis & alijs sequētibz excepto vltimo loco vbi si figura nō nominetur non debet poni cifra: quia esset frustra cum nulla figura ellet post illam cuius significatio deberet augeri per talem cifram: quia dixi vt cifra non valet de se aliquid nisi ad augendum significatū sequentium figurarū. exemplū quādo omnes figure notantur: vt volo scribere tria milia quattuorcenta nonaginta sex: scribam sic. 3496. exemplū quādo non ponitur vnitates vt volo scribere tria milia quattuorcenta nonaginta: scribā sic. 3490. exemplū quādo nō ponitur vena: vt volo scribere tria milia quattuorcenta sex: scribam sic. 3406. exemplū quādo nō ponitur cetera vt tria milia nonaginta sex: scribam sic. 3096. exemplū quādo non ponitur millena: vt quattuorcenta nonaginta sex: scribā sic. 496 simili modo facies in alijs: taliter q̄ si nulla denominatio pretermittatur in omnibus locis scribantur figure significatiue: sed vbi aliqua denominatio subicitur ibi cifra ponatur loco suo excepto vltimo loco vt dictum est.

# Tractatus

**S**i vero volueris numerū aliquē scriptum voce aut mente exprime-  
re et nominare valorem eius: diuide illius figuras per ternarios ita q̄ in-  
ter quilibet tres figuras ponas lineam subtilissimā. et post hoc primam  
illarum trium dicas vnitatem. secūda denā. tertiam centenā. similiter in  
alijs tribus sequentibus. prima earū erit vnitās/ secunda dena/tertia cen-  
tena. et eodemmodo in alijs tribus sequentib⁹: et sic sine fine. sed erit hoc  
differentia q̄ prime tres figure non habent aliquam communem denomi-  
nationem. sequentes vero tres habent mille pro communi denominatione.  
Item alie tres habent milles mille quod dicitur cuento pro communi  
denominatione. et rursus alie tres denominantur a millesies cuento. et  
alie tres sequentes denominantur communiter a millon. alie tres a mille-  
sies millon. et ita ascendendo in infinitum: vt patet in hoc exemplo.  
mil. sū. sūma. mil. millō. millō. mil. cuc. cucū. mille.  
9 5 7 / 6 5 3 / 9 7 8 / 2 4 5 / 3 4 9 / 1 8 6 / 3 5 7 / 2 4 3 /

**D**ico ergo q̄ si proponeretur alicui vnus numerus ita magnus  
et tot continens figuras. Prime tres valent ducenta quadraginta tria/  
alie tres sequentes valent tricenta quinquaginta septem millia/et iterum  
sequentes tres valent centum octuaginta sex cuento et rursus sequentes  
tres valent tricentos quadraginta nouem mille cuentos/ et alie tres valēt  
ducentos quadraginta quinq; millones/ et adhuc sequentes tres valent  
noningentos septuaginta octo mille millones/ et etiam sequentes tres  
valent sexcentas quinquaginta tres summas/ et tres vltime valent nonin-  
gentas quinquaginta septem mille summas. Si ergo totum numerum  
coniunctim nominare voluerimus dicemus q̄ valet Noningentas quin-  
quaginta septem mille et sexcentas quinquaginta tres summas/ noningē-  
tos septuaginta octo mille et ducentos quadraginta quinq; millones/ tre-  
centos quinquaginta septem mille et ducentos quadraginta tres denari-  
os totus valor illius numeri. et sic patet q̄ vnusquisq; numerus licet scri-  
batur a dextris ad sinistram: tamen nominatur a sinistris ad dexteram.  
Et sic patet de numeratione in genere. Quid sit et quomodo sit numeri  
dum valorem numeri vel voce vel mente vel scripto representando:

## Capitulum secundū de additione vel summa.

**C**apitulum secundū habet quattuor partes. Prima ostēdit qd  
sit addere vel summare et quis finis eius. Est autem addere plu-  
res numeros in vnum colligere qui vnus denotat valorem om-  
nium illorum plurū: vt tres quattuor ocio sex faciūt simul col-  
lecti viginti vnum: qui dicitur summa aliorū Et finis hui⁹ speciei vel mo-  
di numerandi est vt quando habemus nominare plures mīeros possum⁹  
omnes eos vnica oratione proferre vt si vidi alicui vna vice tot solidos/  
alia vice tot/ et alia vice tot/ dicam summam vno verbo ego vidi tibi  
quindēcim vel viginti solidos/ hac indigent dispensatores bonorum com-  
muniter. Secunda pars ostēdit modum scribendi numeros addendos.



# Arithme. Practi. Algorismi.

debent enim sic scribi vt primo ponatur vnus eorum si possibile sit maior per suas figuras scriptus vt dictū est capitulo precedēte. deinde sub illo scribat alius taliter q̄ vnitas eius sit sub vnitate p̄mi et dena sub dena et centena sub centena directe et postea scribatur alius nūerus sub illis eodem modo figura sub figura recte positus: et ita si plures numeri fuerint eadem forma scribant et sub eis proiciatur vna linea secundū longitudi nem: vt patet hic.

**T**ertia pars dat modū operadi. Cum ergo vo  $\begin{array}{r} 643 \\ 257 \end{array}$  lueris summare plures numeros in vnu incipe a dextris ab vnitatib⁹ et omnes figuras numerorū que ibi fuerint in primo loco simul collige men te in vnu et vide numerū inde resultantē vtrum sit vnitas vel dena vel cō positus. si sit vnitas ponatur sub linea in eodem loco per suam figuram scriptus: si vero sit talis numerus dena in primo loco sub linea ponat cis fra et talis dena seruetur in mēte et nomine nomine sue vnitatis et addat cum figuris secūdi limitis. et si talis numerus resultans ex additione dic tarū vnitatum sit cōpositus: vnitas eius ponatur sub linea in primo lo co et dena eius seruet in mente et addatur figuris secūdi limitis. Facto autē primo limite eodē modo est operandū in secundo limite vbi sunt de ne colligendo omnes figuras ibi existentes in vnu et videndo numerū res ultantē vtrū sit vnitas vel dena vel cōpositus et faciendo vt prius et hoc facto trāseas ad tertiu limitē vbi sunt centene eodē modo operando vt in alijs limitib⁹ hoc prenotato q̄ quādo colligis figuras existentes in se cundo vel in tertio vel quarto limite non nomines eas vt denas vel cente nas sed vt vnitates et hoc ppter facilitatē operis: finitis autem omnibus li mitibus numerus qui apparet infra lineam erit summa omnū superiozū in quo omniū valor ostenditur.

His torum omnium sequuntur exempla.

|         |      |              |      |              |                |              |      |        |
|---------|------|--------------|------|--------------|----------------|--------------|------|--------|
|         |      | <sup>2</sup> |      | <sup>1</sup> | <sup>345</sup> | <sup>8</sup> |      |        |
| exēplum | 3476 | addēdi       | exē. | 789          | addēdi         | exē.         | 297  | addēdi |
| p̄mi    | 2322 | 2            | scōi | 211          | 1              | tertij       | 473  | 8      |
|         | 5798 | summa        |      | 1000         | summa          |              | 1115 | summa  |

**I**n primo exemplo ex additione semper resultat vnitas vel digit⁹ que ibidem subseribit. In secundo semper resultat dena vel articulus: idco ci fra subscripta ad alium limitē trahitur. at vbi in vltimo limite colligim⁹ denam ad alium limitē nouum cōstituēdum ipsam solam pducimus. In tertio autē exemplo resultat ex additione numerus cōpositus: cui⁹ pars vbi subseribit et pars ad alium limitē trahitur. Sed si in numeris adden dis reperiat cifra vel cifre si ibi cum eis in eodē limite nulla figura signi ficatiua ponatur p omnib⁹ illis cifris scribatur vna cifra sub linea in eos dem limite: si autem cum cifra vel cifris sit etiam aliqua figura vel figure significatiue dimissa cifra vel cifris ponatur figura significatiua subscri pta: exemplum.

|                              |                 |        |              |
|------------------------------|-----------------|--------|--------------|
|                              | <sup>3040</sup> |        | <sup>1</sup> |
|                              | 300             | addēdi | 1            |
| Sciendū vltērius q̄ si velle | 3340            | summa  |              |

mus facere additionē iter nume



# Tractatus

res diuersorum valorum non possemus predicto modo operari: quia iste modus dictus talis non valet: nisi in numeris similibus: sed quia operatio presupponit diuisionem: ideo in secundo huius tractatu est ponenda. ¶ Quarta pars dat probationem que fit per nouē vel per septem: sed quia probatio septenarii est difficilis pro incipientibus ea dimissa ponam aliam: subtrahere ergo nouem quotiens poteris a numeris addendis simul sumptis: et illud quod remanet minus quam nouem scribe extra et vocetur prima nota: similiter a summa totali aufer nouem quotiens poteris: et illud quod remanet citra nouem vocatur secunda nota que si erit equalis prime bene operatus es: alias errasti et oportet resumere opus tuum: et hec de additione. ¶ Et nota quod ad istam speciem reducitur alia species minus principalis que dicitur duplatio aut triplatio nam si eundem numerum bis scripseris et addideris in vnam summam habebis duplum illius: et si ter scripseris et collegeris in vnam summam habebis triplum illius: unde pro re tam facili non oportebat dare speciale capitulum. Exemplum.

|               |              |                                       |
|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 496 2         | 496 3        | Similiter et progressio ad hanc       |
| 496 2 Exēplū. | 496          | speciem reducitur: est enim pro-      |
| 992 duplū     | 496 3        | gressio plurium numeroꝝ talis         |
|               | 1 488 triplū | ordinatio in eodē limite quod quatuor |

excedit secundus primum tantum excedit tertius secundum: et quartus tertium: unde inter eos est proportionalitas arithmetica colligere ergo tales numeros in vnam summam est operatio progressionis quod per additionem convenientissime fiet vt hic.

## Capitulum tertium de subtractione.

**T**ertium capitulum quattuor habet partes prima ostendit quid sit subtrahere et quis finis eius. Est autē subtrahere vnū numerum ab alio demere vt videatur residuum vel excessus vnus ad alium et semper minor numerus subtrahitur a maiore vel equali nūq̃ autem maior a minori poterit subtrahi. Subtractio: nis finis est ad emendum et vendendum principaliter et ad mutuandū vt si tu accepisti a me in mutuum decē solidos vel aliquid huius et postea tu soluisi aliquē partem eorum videre possimus residuum quod adhuc tene ris solvere. Secunda pars dat modum scribendi numeros in hac specie. Debēt namq̃ numeri scribi precise eodē modo sicut dictum est in additione: vnus numerus sub alio et vnitas vnus sub vnitate alterius vena sub vena. et. et. et. protrahe lineam sub eisdem: sed in hoc differt ab additione: quia in illa possunt esse multi nūeri addendi hic vero non possunt esse: nisi duo numeri quozū vnus dicitur mutuū vel numerus a quo debet fieri subtractio: alius vero dicitur solutio mutui vel numerus subtrahendus ab alio: est et alia differentia: quia in additione licet bonū sit ponere numerū maiorem supra et minores infra: nō tūc est necessariū ad opus quod ita bene fieret si minor numerus poneret supra sicut fit econtrario tūc in subtractione ex necessitate operis est quod superior numerus sit maior vel saltē equalis inferiori et

# Arithme. practice Algorithmi.

numq̃ potest esse minor. Debent ergo scribi sic. 689  
 Sed nota q̃ ille numer⁹ dicit maior alio qui plu 343  
 res habet limites vel loca vt pote si vnus habeat quattuor alii vero tri  
 loca vt hic. 1000 lia loca tamē figura posterior vni  
 Uel si habent equa 999 us sit maior q̃ figura postrema al  
 terius vt hic. 682 quales: ille est maior cui⁹ figura penul  
 vel si ille sint e 397 tima est maioris valoris vt hic.  
 495 et iterum si vltime et penultime sint equales oportet aspicere  
 479 in alijs vsq̃ ad primū limitem descendendo.

**T**ertia pars dat modū operandi: et debes incipere a dextris in digi  
 tis primi loci aut limitis: et ibi subtrahē inferiorē figuram primi limitis  
 de superiore eiusdem limitis et vide vtrum illa figura superior sit maior aut  
 minor aut equalis inferiori: si fuerit maior pone subtrahē lineā in eodem li  
 mitē excessum eius super inferiorē: si vero fuerit equalis pone sub lineā in  
 eodem limite cifram ad denotandū q̃ nullus est excessus vnus ad alterā.  
 si autē superior sit minor tunc non poterit inferior subtrahi ab illa: transfer  
 ergo te ad sequentē figuram superiorē et mutua ab illa vnitatē et habeas  
 memoriā q̃ illa figura sequens valeat vna minus et illa vnitates adducta  
 ad limitē primū valebit decem: quibus addas illam figurā que ibi est et fa  
 cies vnum numerū compositū ab illo ergo subtrahē figurā inferiorē resi  
 duum subtrahē scribēdo facta autē subtractione primi limitis eodemodo  
 te habebis in alijs locis vel figuris sequētib⁹ et reputabis te semper esse  
 in primo loco q̃tum ad modū operandi et q̃tum ad nomina figurarū vt su  
 pra dictū est capitulo precedēte q̃ debet nominari vt vnitates vel viginti  
 factis ergo illis limitib⁹ omnibus habebis sub lineā vnum numerū inferior  
 rem qui erit residuum vel excessus maioris numeri ad minorem. exempla  
 istorum sequuntur.

exēp. 689 a quo subtrahit 5 exē. 754 mutuū 7 exē. 932 mu. 5  
 primi 343 subtrahendus 5 scđi 754 solutio 7 scđi 686 solu. 5  
 346 residuū 000 residuū 2 16 resid.

**I**tem est notandū q̃ quādo vis mutare illam vnitatē dictā a figura se  
 quenti si in illo loco nō inueneris figuram significatiuā sed cifrā: tunc opor  
 tebit trāsire vltra ad sequentē limitem vel si ibi nō inueneris figurā signi  
 ficatiuā transfer te ad aliam sequentē quousq̃ inuenias figuram et ab il  
 la summe vnitatē que in tuo limite valebit decem vt dictum est: sed omnes  
 cifre ille intermedie valebūt tunc singulos nouēnarios. et ideo si figura que  
 esset sub tali cifra esset subtrahēda ab illo nouēnario ibi intellecto. Item  
 sciendū q̃ si figura a qua vis accipere illam vnitatē mutuā sit vnitatis  
 figura: tunc eam adduces ad tuum limitē et in loco suo intelligatur esse ci  
 fra. Item attēde q̃ si due vltime figure essent pares nihil deberes ponere  
 infra: quia etiam ponere cifram ibi esset superfluum vt supra dictum est: isti o  
 rum sequuntur exempla.

exēplū 402 mutuū 6 exē. 5 12 mutuū 3 exē. 342 mutuū 0  
 primi 235 solutio 6 scđi 349 solutio 3 scđi 321 solutio 0  
 167 residuū 163 residuū 21 residuū



# Tractatus

**¶** Quarta pars dat probationē opationis: que est duplex. vna per nouē sicut dictū est. subtrahere nouem quorū poteris a numero superiore et accipere ibi notam primā deinde subtrahere nouem quoties poteris a duobus in serionibus simul sumptis et accipe notam secundā eorū et si equales fuerint ille note bene opatus es sine autē errasti. Alia probatio est per additionē: et hac vtiūtur mercatores scilicet addendo vel sumādo in vnum duos inferiores et si ex tali additione puenit talis numerus qualis est superior erit bene factū alias erratum. Et cōtrario posset additio probari per subtractionē: scilicet subtrahēdo a totali summa vnum numerorū additorū et remanebit quāritas alterius vel aliorū: accipiant exempla superius. Ad istam speciem reducitur alia minus principalis que vocatur dimidiatio et fit hoc modo. incipe a sinistra ad dexterā. et vide vtrum illa vltima figura sit par et tūc pone eius medietatē in eodem limite sub linea et eodē modo in alijs figuris. Si sit impar: deinde vnitatē ab illa per intellectū et remanebit par cuius subberbe medietatē: et deinde transfer illam vnitatē ad sequentem figurā que valebit decē ibidem posita et adiunge ei aliam figuram ibi existentē et fiet vnus numerus cōpositus cuius subscribere etiam medietatē. et si ibi adhuc remaneat vnitatis aliqua ppter imparitatē trāffer illam ad sequentē limitē et fac vt prius quousque venias ad primā figuram quia si ibi supauerit vnitatis scribe illam extra totū numerū hoc modo.

qz significat qd sit medietas talis vnitatis. et si cōtingat qd in illa prima figura vel loco non sit nisi vnitatis scribe subtus cifram et extra he foras illam vnitatē et scribe eius medietatē modo dicto/exempla. exēplū 642 totum exēplū 957 totū 1 exē. 541 totum primū 321 mediuū secūdi 478 me. 2 scilicet 270 mediuū.

**¶** Istam operationē poteris probare facilliter per duplicationē: si enim numerū inferiorē duplaueris modo supradicto pueniet superior quando bene operatus es.

## Capitulum quartum de multiplicatione.



Quartum capitulū quattuor habet partes: prima ostendit quid sit multiplicare et quis finis eius. Est autem multiplicare vnum numerū pluries sumere scilicet toties quot vnitates sunt in reliquo. Ex quo patet etiam qd etiam in ista specie solum duo numeri sunt necessarii scilicet ille quē multiplicare volumus: et alter numerus qui denotat quot vicibus illum assumemus: primus solet dici multiplicandus/secundus multiplicans. primus pferitur notialiter/secundus aduersbialiter. et ad facilius operandū debes minorem facere multiplicatē quāvis non sit necessariū. tantum enim valet dicere octies quattuor: sicut quater octo. Finis multiplicationis est ad apreciandū res: et ad comprehendendū facilliter valorē alicuius mercatū: aut alicuius monete grosse cito valore vnius partis eius datis partibus equalibus: et hoc modo sciemus dicere tot aurei erunt tot denarii. et tot mense panum vel vini valebūt tot solidos etc. Secūda pars dat modū scribēdi numeros in hac specie debes enim scribere primo multiplicandū superius. deinde multiplicantē inferius retento ordine figurarū vt dictum est in additione. s. vnitatis sub vnitatis etc. et progredere lineam subtus vt si velles multiplicare. 124. per 12. scri-



# Arithme. Practi. Algorismi.

be sic. 124 multiplicadus dum opandi sed  
 Tertia pars dat mo- 17 multiplicans aduertendu q mul  
 tiplicatio vnitatē per vnitatē aut digitū per digitū non oportet scribere  
 figuras. quia cū scribatur figure in hac specie presupponit q sciam? men-  
 te multiplicare digitū per digitū. Et ad hoc sciendū nota duas regulas.  
 prima q videas inter illos duos digitos quos vis inuicē multiplicare qd  
 illozū sit maior et attende p quot vnitates distat a decem tunc accipe mi-  
 norē et aufer eum a sua vena toriens quot sunt vnitates illius distantie et  
 quod remanet est ppositū. Verbi gratia. octies sex faciūt. 48. nam octo  
 distat a decē per duas vnitates. ergo subtrahatur. 6. de sexaginta que est  
 sua vena bis et remanebūt. 48. similiter in oñibus alijs. Secūda regula  
 est q accipias in sequēte tabula vnum digitum illozū in parte supiore et  
 alium digitū in parte sinistra. postea videas quis numerus respondet in  
 directo vtriusq; in illa tabula ille est quesitus. Verbi gratia. indirecto ho-  
 rum duozū. 6. et 8. respondet iste numerus. 48.

## Sequitur tabula multiplicationis.

|   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 0 | 9  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 1 | 1 | 9  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 2 | 1 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8  | 6  | 4  | 1  |
| 3 | 1 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9  | 6  | 3  |
| 4 | 1 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8  | 4  |
| 5 | 1 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5  |
| 6 | 1 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6  |
| 7 | 1 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7  |
| 8 | 1 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8  |
| 9 | 1 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9  |

Postq; ergo scripseris  
 nūeros multiplicandos:  
 et sciueris modo dicto  
 multiplicare digitū per  
 digitū incipe a dextris:  
 et cum prima multipli-  
 cantis. s. inferioris mul-  
 tiplica bis primam supe-  
 rioris. et vide ex illa mul-  
 tiplicatione vtrum exces-

sit digitus vel vena vel cōpositus numerus. si digitus debz sub linea scri-  
 bi in eodem limite. si vena transferat mente ad sequentē limitem et ibi cō-  
 fra ponatur. si cōpositus: ponatur ibi digitus eius et transferat articulus  
 vt dictū est in additione: facto primo limite: iterū cum eadem prima infe-  
 rioris multiplice secūda superioris et scribat numerus inde pductus mo-  
 do dicto sub linea semper obseruādo ordinem in limitibus et nominādo fi-  
 guras ac si essent simplices digiti. et facto secūdo limite iterū cum eadem  
 prima inferioris multiplice tertia superioris penitus eodē modo et sic p  
 alias quousq; venias ad vltimā. quo facto iterū reuere et cum secūda  
 numeri inferioris multiplica modo dicto omnes figuras numeri superio-  
 ris hoc notato q incipias scribere numeros resultantē a loco figure se-  
 cūdi limitis et sic versus sinistram. et illo facto iterum reuere ad mul-  
 tiplicandū omnes figuras superiores per tertiam inferiorē: et sic iterum  
 donec omnes figure superiores sint multiplicatē per omnes inferiores. et tunc  
 proficies vnam lineā sub omnib; illis numeris scriptis. et colliges omnes  
 eos in vnam summā sūm precepta data in additione et tota illa summa est  
 numerus quē querebas: sequitur exempla.

# Tractatus

exēplū primū 1 2 4 multiplicādu  
 1 2 multiplicans  
 2 4 8  
 12 4  
 14 88 summa

exēplū 34 85 multiplicādu  
 5 69 multiplicans  
 aliud 3 13 65  
 2 0 9 10  
 17 4 25

Et si occurrat inter illas figuras aliqua cifra vel cifre ex multiplicatio-  
 ne tali figure cum illa cifra vel exēplū 20304 multiplicādu  
 etiam vnius cifre cum alia po- 320 multiplicans  
 ne solam cifram sub linea vt pa- 00000  
 tet in hoc exemplo. 40608  
 60912

6497280 summa

Et si tam in multiplicante q̄ in multiplicādo numero fuerit vna sola figu-  
 ra cum plurib⁹ cifris in p̄mixtis et cōtinuis: tunc sufficit multiplicare fi-  
 gurā illam cum alia figura et post q̄ scripseris productū adde omnes il-  
 las cifras vtriusq; numeri a parte dextra vt patet in his exemplis.  
 exēplū. 500 exēplū. 7000 exēplū. 80000  
 4 30 4000  
 2000 210000 320000000

Quarta pars dat p̄bationē et fit per nouē vt dictū est in alijs. nam si ac-  
 ceperis notā supioris numeri subtrahēdo nouem quoties poteris. et ite-  
 rum acceperis notā inferioris. s. multiplicātis. et eas inuice multiplicau-  
 ris. et a p̄ducto acceperis notam subtrahēdo nouem si nota quā accipies  
 a totali summa inferiori fuerit illi tertie note equalis bene operat⁹ es sin  
 autē errasti. et ad hoc melius intelligendū facies crucē in cuius parte su-  
 periori pones primā notam in inferiore secundā in sinistra parte tertiā no-  
 tam in dextra vero quartam: vt volo probare primū  
 exēplū faciam sic.

7  
 3 + 3  
 3

et est operatio vera. Simili modo facies in alijs exemplis.  
 Ad istam speciē poterit reduci duplatio et triplatio. nam si quēlibet nume-  
 rū per duo multiplicaueris. pueniet duplū eius et si per tria multiplicaue-  
 ris habebis triplū eius. Etiam ad istam speciē reducitur p̄gressio hoc mo-  
 do vide vtrū numerus illarū figurarū in tali p̄gressionē positarū sit par  
 vel impar: si impar multiplica talem numerū per figurā mediam illarū et  
 pueniet p̄positū. s. q̄tum valēt omnes ille figure vt hic 1. 2. 3. 4. 5. vbi sunt  
 quinq; figure quaz media est 3. ter ergo q̄nq; sunt. 15. qui est valor omnū  
 illarū. Sed si figure fuerint in numero pari: adde primā vltimē et multipli-  
 ca illas per medietatē numeri figuraz et erit factū vt hic 1. 3. 5. 7. vbi sunt  
 quattuor figure addita ergo prima. s. 1. cum vltima. s. 7. sunt 8. quib⁹ mul-  
 tiplicat⁹ per duo sūt. 16. que est sūma quesita. Sed ista spēs raro venit in  
 vsum: nisi q̄ p̄dest in arithmetica speculatiua pro arithmetica p̄portions  
 litate.

## Capitulum quintū de diuisione.

Quintū capitulū habet quattuor partes. prima ostendit quid sit di-  
 uidere et finis eius. diuidere est vñū numerū in plures partes equas



# Arithme. Practi. Algorithmi.

les secare. vnde in hac specie etiam duo numeri sunt necessarij scz primus diuidendus et est maior secundus diuisor et minor qui debet denotare in quot partes volumus alterū secare. ¶ Finis diuisionis est vt sciamus quo modo pluribus debet distribui aliqua pecunia secundum partes equales quantum debet habere quisque eorum: et quando habemus aliquā magnā copiā denariorū et voluerimus videre quot solidi vel quot aurei aut argētei fierent ex illis et ad plura alia valet. vnde sicut multiplicationem possumus grossiorem monetam reducere ad subtiliorem: ita per diuisionem possumus ex minore moneta constituere maiorem. ¶ Secunda pars dat modū scribendi debes enim primo scribere diuidendum maiorem supra et sub eo statim pone duas lineas aliquantulum distantes: ita vt inter eas possit esse alius numerus isto modo. 362.

¶ Deinde scribe diuisorem sub illis duabus lineis et non cures obseruare ordinem limitum. vt scz vntas sit sub vntitate et vena sub vena et c. sed vltimam diuisoris scribe sub vltima diuidendi et penultimam sub penultima et sic de alijs versus dexteram eundo scribes etiam diuisorem directe ante diuidendum cum linea inter media vt hic

24 | 36 2

¶ Tertia pars dat modū operandi et debes incipere a sinistra parte versus dexteram eundo. et tunc vide vtrum diuisor sit vna tantum figura sine cifris vel figura cum cifra vel cifris vel in diuisione sint plures figure. Si sit vna tantū figura sine cifris: tunc subtrahat illam ab vltima diuidendi quotiens poteris et nūmerum illarum vitium scribe inter illas duas lineas in eodem limite cū diuisore et cum figura a qua subtrahitur diuisor: et si aliquid fuerit residuum pone illud supra figuram superiorem a qua subtrahitur vel pone cifram desuper si nihil remanserit. Facta illa prima subtractione mutetur diuisor ad sequentem locum: et eodem modo subtrahatur a sequenti figura cum residuo precedentis si sit quod debet computari pro vna: et subtrahatur quotiens poterit et scribas numerum illarum vitium inter lineas in eodem limite: et scribe semper residuum desuper: et sic facies in omnibus alijs figuris vsque quo ventas ad primā partis dextre et tunc numerus quem inuenis inter lineas est numerus pueniens cuiuslibet parti earum in quas illud totum est diuisum et si aliquid remanserit quod non possit diuidi illud significat quot partes vnus integri adhuc debentur cuiuslibet parti ultra numerum inter lineas inuentū talē ergo nūerū extrahe: et scribe foras et sub eo vnam lineam et sub linea pone diuisorem hoc modo

et significat hoc qd sunt due quarte vni rei et sic alijs. ¶ Item qd si aliqui diuisor nō possit subtrahi ab aliqua figura debet poni cifra inter lineas et illa figura manet integra quousqz diuisor mutetur ex cepto quando est in vltimo loco versus sinistram: quia ibi nihil proficeret cifra vt dictum est supra. Istorum sequitur exempla.

|        |        |                   |      |
|--------|--------|-------------------|------|
| 00     | 00     | 2   00            | 000  |
| 3   24 | 3   42 | 4   362   6   624 |      |
| 8      | 14     | 90                | 104  |
| 3      | 33     | 44                | 1666 |

¶ Si vero in diuisore sit vna figura cum cifra vel cifris est idē modus operandi: vt in alia exemplo



# Tractatus

q' diuissio nō pcedit vsqz ad primam diuidendi sed debet cessare per tot figurās ante primā quot sunt cifre in diuissore. et ille figure debent remanere indiuisse. in alio nullo modo differt operatio et debes illas figuras extra scribere cum diuissore vt dictum est. etiam addendo quod residuū fuerit ex diuissione.

**S**i aut in diuissore fuerit plures figure est difficilior modus operandi: s3 scripto numero diuiden-

|        |      |        |       |
|--------|------|--------|-------|
| 2      | 00   | 93     | 00    |
| 10     | 367  | 200    | 6493  |
| exēpli | 36   | exēpli | 32    |
|        | 1 00 |        | 2 000 |
|        | 1    |        | 2     |

do superius et suis lineis sub eo protractis scribe diuissorem sub lineis taliter q' vltima figura diuissoris sit sub vltima diuidendi et penultima sub penultima et sic de alijs si plures fuerint: et incipe a sinistris et subtrahere vltimam de vltima quotiens poteris taliter q' non subtrahatur vltra nouem vices et penultimam de penultima et aliam de alia hoc seruato q' totiens subtrahatur sequentes figure a suis superioribus precise quoties vltima a sua superiore vltima: alias non esset vera operatio q' si alie sequentes non possint totiens subtrahi a suis quotiens vltima ab vltima: tūc nō subtrahas tot vicibus vltimam ab vltima: sed vna minus: et tunc iterum considera vtrum alie sequentes tot vicibus possint a suis superioribus subtrahi: vel saltem ab illis cum residuo precedentium q' si adhuc non sit possibile diminue vnam aliam vicem ab vltima quousqz inuenias q' sit possibile totiens subtrahi vnam sicut aliam a sua superiore: et tunc pone numerū illarum vicium inter lineas super figuram de terriori diuissoris. et tunc cum illa multiplica omnes figuras diuersoris primo vltimam et numerus prouementem et subtrahere a supra posita sibi figura diuidendi et si sit aliquid residuum de super scribe: si autem nihil remaneat scribe cifram super figuram illam superiorem. similiter cū eadem figura multiplica sequentem figuram diuissoris et pductum subtrahere a sua superiore. et si sit residuum de super scribe alias pone cifram. et similiter multiplicabis cum eadem quālibet aliarum figurarū diuissoris eodē modo operādo. quo facto opus erit mutare omnes figuras diuissoris per vnum locū ita q' vltima diuissoris sit penultima diuidendi: et penultima diuissoris sub ante penultima diuidēdi et ita de alijs. et tunc iterū quere quoties vltima diuissoris possit subtrahi a sua superiore vel solayel cū residuo precedens: taliter q' sequentes possint a suis subtrahi superioribus totiens: q' si non possint diminue in numero vicium quousqz sit equalitas in oibus sicut fecisti in precedente opatione: et equalitate inuēta scribe numerū vicium iterū inter lineas et cum illo multiplicas omnes figuras diuissoris obseruando modū penitus eūdem vt prius fecisti et illo facto iterū mutabis figuras diuissoris et opaberis eodē modo. quousqz prima diuissoris veniat ad primā diuidendi et tunc est finis operationis. et habebis inter lineas numerum qui dicitur quotiens qui denotat quantum debetur cuilibet parti. et si aliquid remanserit supra indiuisum illud extra scribe et sub eo pone diuissorem cum linea media. et habebis siue pars alicuius integri vltra illa integra debeatur

# Arithme. Practice Algorismi.

enlibet. Et si aliquādo contingeret diuidendo q̄ vltima diuiforis poffet  
fubtrahi a fua figura tantū ſemel. alie vero non poffint neq; bis neq; ſe-  
mel a ſuis figuris fubtrahi: tunc ponas cifram inter lineas ad denotādū  
q̄ nulla vice fubtrahitur excepto ſi hoc accideret ſub vltima diuidendi ra-  
tione iam dicta. et figure omnes ſuperiores remaneant tunc intacte ⁊ inte-  
gre ita q̄ nihil fubtrahas ab eis: ſed mutabis figuras diuiforis q̄libet p̄  
vnū limitem vt iam dictum eſt. Vnde ad hanc ſpecie exercēdā oportet  
q̄ habeat alias duas ſuperiores in promptu. ſ. multiplicatiōē et ſubtra-  
ctiōē horum omnium ſequuntur exempla.

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $  \begin{array}{r}  0 \\  04 \\  9 \overline{) 229} \\  \underline{18} \phantom{0} \\  49 \\  \underline{45} \phantom{0} \\  4  \end{array}  $ <p style="text-align: center;">9 2 2 9<br/>24   4 6 5 <i>exm.</i><br/>19<br/>244<br/>2</p> | $  \begin{array}{r}  0 \\  03 \\  143 \\  228 \\  00326 \\  11939 \\  594973 \\  1226 \\  485555 \\  4888 \\  44  \end{array}  $ <p style="text-align: center;">3 9 3   1 1 9 3 9<br/>4 8 5   5 9 4 9 7 3 <i>exm.</i><br/>1226<br/>485555<br/>4888<br/>44</p> | $  \begin{array}{r}  0 \\  00031 \\  22375 \\  10 \\  065657 \\  45 \\  3401020 \\  75578 \\  4555555 \\  444444  \end{array}  $ <p style="text-align: center;">10   065657<br/>45   3401020<br/>75578<br/>4555555<br/>444444</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Quarta pars dat probationē: et eſt duplex. prima per .9. ſ. ſubtrahendo  
nouem quotiēs poteris a diuiſore ⁊ ſerua notam. deinde accipe ſimiliter  
notam quotiēs illius. ſ. qui eſt inter lineas ⁊ illas notas inuicem multipli-  
ca ⁊ a numero pueniente accipe notam cui note adde etiam notam illius  
reſidui quod remāſit indiuiſum. q̄ ſi exceſſerit nouēnariū accipe illius no-  
tam remouēdo inde nouem: ſi ergo huic note vltime fuerit equalis nota  
numeri diuidendi bene operatus es/ alias erraſti. Secunda probatio eſt  
multiplicādo diuiſorem numerū per quotiētem ⁊ illi producto addendo  
reſiduū ex diuiſione. et ſi bene operatus es proueniet numerus diuiden-  
dus. Ecceuerſo poſſet multiplicatio probari per diuiſionē ſcilz diuidendo  
ſummā multiplicatiōis per multiplicandū: et proueniet in quotiente mul-  
tiplicans vel ecceuerſo ſi bene operat⁹ es. Ad iſtam ſpeciem poſſet etiam  
reduci dimidiatio facilius q̄ ad ſubtractiōē. nam ſi numer⁹ ppoſitum p̄  
duo diuiſeris habebis medietatē eius quod ſatis eſt manifeſtū per practi-  
cas datas in hoc capitulo iuxta principiū tertie partis. Probatio ſeptē-  
narij inſallibilis prodictis ſpeciebus fit hoc modo: incipe in quolibet nu-  
mero per ſe ſumpto a ſiniſtra ⁊ vide in vltima figura ſi poſſit inde extrahi  
ſeptem ⁊ ſubtrahere ſi potes: et pcede deinde ad ſequentē et ſubtrahere ab ea  
cum reſiduo pcedētis. 7. quotiens poteris. et tunc procede eodem mo-  
do vſq; ad primā figuram et q̄ ibi remanet eſt nota q̄ queris et operare ſi  
cut per notam nouēnarij.



# Tractatus

## Capitulum sextum de radicum extractione.



**S**extu caplin hz quattuor ptes. prima ostēdit quid sit radicē extrahere et quis eius finis. Radicem extrahere est alicuius nūeri radicē inuenire. et radix eius dicitur quidā ali<sup>9</sup> nūerius qui in se ductus. i. p se multiplicatus cōstituit illuz vt radix 9. est. 3. ter em̄ tria sūt nouē. Sed est supponēdū ex arithmetica speculatiua q<sup>o</sup> quidā nūeri sūt lineales/ quidā supficiales/ quidā solidi/ et inter supficiales quidā sūt angulares/ quidā circulares et angulariū quidā sūt equaliū laterū/ quidā altera pte lōgiores: et eorum q<sup>o</sup> hnt equalia latera/ quidā sūt triangulares/ quidā quadrāgulares quidā pentagoni: et exagoni aliū et sistr eptagoni. sistr solidoz numerorum/ quidam sūt sperici/ quidam augulares: et angularium/ quidaz sūt cubi/ quidam aseries/ quidā cunei/ quidā laterculi: et aliū paralelipidi. Cuz igit radicem alicuius numeri volumus querere intelligimus solum de numeris quadratis et cubicis ppter eorū pfectionē et regularitatē: comprehendendo sub hīs numeros circulares qui omnes sūt quadrati. et numeros spericos qui oēs sūt cubi. Finis huius speciei est scire multas mensuras in geometria practica et etiam multa sciūt in astrologia p radices quadratorū et cubicorum numerozū. ¶ Secūda pars dat modum scribendi in hac specie non est nisi vnus numerus quo scripto per suas figuras diuide ipm totum per binas figuras pro radice quadrata vel p ternas pro radice cubica incipiendo a dextris eūdo ad sinistram cum quibusdā lineis subtilibus. et deinde prophice sub eo duas lineas equi distātes secūdum longitudinem numeri sicut fecisti pro diuisione licet ibi debeant esse magis distantes q<sup>o</sup> in diuisione hoc modo.

34 | 78 |      3 | 478 |      ¶ Tertia ps dat modū operandi et pmo in numeris quadratis vbi notandum q<sup>o</sup> numerus quadratus dicitur ille qui cōsurgit ex multiplicatione alicui<sup>9</sup> numeri in seipsum semel. vt nouem cōsurgit ex ternario et. 16. ex quaternario. Cum ergo volueris alicuius numeri querere radicem quadratam incipe a sinistris: et vide an ibi ante primā lineam sit vna sola figura / vel duo: si vna: quere aliquem numerum qui per se multiplicatus debeat illam figuram vel quantum poterit ex illa. et residuum si sit scribe super talem figuram sin autem scribe cifram super eā si vero fuerint ibi due figure que resimiliter nūerū qui p se multiplicatus debeat illas duas vel quantum poterit ex eis residuū desuper scribendo. et talem numerū inuentum scribes bis primo inter lineas ibi iunctum cum linea prima descēdente et iterum sub illis lineis in eodem tamē limite: quo facto talem numerum dupla et transfer ad sequentem sequentem inter lineas illud duplatum deinde quere aliū numerū iuxta secūdam lineā bis scribendū sicut prius q<sup>o</sup> multiplicet eū illo duplo ad delendū id quod est supra duplum et postea multiplicet per seipsum debeat id quod erit supra se quo facto predictum duplum mutabis ad sequentem limitē et istum secūdū numerum inuentum dupla et transfer duplatum ad sequentem limitem. deinde iuxta tertiam lineā quere alium numerū qui debet multiplicare duos duplos precedentes ad delendum ea que sūt super illos et postea multiplicetur p seipsum et debeat



# Arithme. Practi. Algorismi.

quod fuerit supra se. et hoc modo si plures sint linee descendentes plures inuenies numeros novos et pluries mutabis duplos numeroz et facies multiplicatiōes vt dictum est quousq; ad finem puenias. et tunc habebis radicem talis numeri infra lineas omnes qui erit numerus quadratus si nihil remanserit supra: vel si aliquid remāserit illa erit radix maioris quadrati sub tali numero contenti. exempla sequuntur.

|     |     |       |           |               |
|-----|-----|-------|-----------|---------------|
| 001 | 001 | 0 00  | 0         | 0 12 0        |
| 161 | 251 | 11441 | 03 00     | 1 28 0        |
| 41  | 51  | 11221 | 671241    | 51471 561     |
| 41  | 51  | 11221 | 811621    | 21431 641     |
| 41  | 51  | 11221 | 217Ra. 81 | 21431 41 1    |
|     |     |       |           | 21 31 41 usa. |

Et si aliquādo duplus ille mutatus nō possit aliquo modo a suo numero subtrahi tunc pone loco illius numeri inueniēdi cifram bis scriptam et remaneat numerus supior integer pro tunc et anteriores ad dexterā ille duplus similiter et cifra debet mutare locum postea alius numerus queratur sub alia linea/ et fiat operatio vsq; ad finem. Postea si radicem illam per seipsam multiplicaueris proueniet numerus primo ppositus si ei addideris suum residuū dum modo illud habeat: et hec est probatio operis.

|        |                  |                             |
|--------|------------------|-----------------------------|
| exēplū | 01 001 01        | 01 21                       |
|        | 91 121 041 erēnū | 01 021 191 701 001          |
|        | 31 601 021 aliud | 41 301 681 951 161 031 21 1 |
|        | 161 1            | 21 401 071 1451 41 801 001  |
|        | 31 01 21 Radix   | 1 41 401 1 181 1            |
|        |                  | 21 01 71 51 Ra. 41 01 01    |

Numerus vero cubus est qui consurgit ex multiplicatiōe alicuius numeri in seipsum bis vt ter tria ter sunt. 28. Bis duo bis sunt. 8. Cum ergo uolueris radicē cubicam alicuius numeri inuenire scripto numero et diuiso per ternarios. quere iuxta sinisteriorē lineam vnum numerum qui per seipsum multiplicatus bis debeat figuram vel figuras ibi existentes ante lineam vel q̄tum poterit ex eis. et scribas bis. s. et inter lineas et sub lineis. deinde ille numerus tripletur et transferat̄ triplum eius ad tertium limitē ab illo in quo est: et sub triplū eius sub eo in eodem limite ponatur: deinde iuxta secundam lineam inueniat̄ alius numerus ex quo cū triplo dicto fiat vnus numerus compositus ex dena et vnitare qui compositus debet multiplicari per predictū numerū secundo inuentū et productū subtrahat̄ a numero supra posito illi triplo deinde iste numerus inuentus per seipsum multiplicet̄ bis et productū a supra posito sibi numero subtrahat̄. quo facto predictum duplum cum suo subtriplo mutetur ad tertiam figuram a suo loco.

# Tractatus

colet numerus iste secūdo inuentus triā tripletur ⁊ ponatur etiam in ter-  
tia figura ab illa in qua est et subtripplum eius sub eo. et tunc iuxta aliam  
lineam inueniat alius numerus qui cum vobus subtriplis precedētib⁹  
faciat vnum numerū compositiū ex centena vena et vnitae qui numerus  
cōpositus primo multiplicet per primū triplum. et productū iterum mul-  
tiplicetur per numerū nunc tertio inuentū et quod puenit valeatur a su-  
p̄posito illi triplo. ⁊ iterum ille idem compositus multiplicet cum alio  
triplo et productū tale multiplicetur per eodem numerū tertio inuentum  
et tota illa summa subtrahat a sup̄posito numero illi secūdo triplo. ve-  
inde ille numerus tertio inuentus multiplicet per seipsum bis et quod pro-  
uenerit subtrahat a sup̄posito sibi nūero. et si adhuc sint plures linee. co-  
dem modo inuenies nouos numeros iuxta illas et mutabis triplos a lo-  
cis suis versus dexterā et facies semper numerū compositiū ex plurib⁹ fi-  
guris qui debeat multiplicari cum illis triplis singulatim et cum eodem  
numero nouiter inuēto sicut dictū est. et si alicubi non possit dari talis nu-  
merus inuentus pone cifram in radice sicut fecisti in quadratis ⁊ similiter  
si radicem illam per seipsam bis multiplicaueris et p̄ducto residuum ad-  
dideris si sit residū pueniet numerus primo p̄posito quādo bene ope-  
ratus es. et quādo nullum est residū numerus ille erat p̄fecte cubus sed  
quādo est aliquid residū illa erit maioris cubi radix que sub lineis appa-  
ret ex numeris illis plures inuentis composita: sequūtur exempla.

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 000   | 000   | 0 000 | 0     | 0 200 |
| 01    | 01    | 01    | 01    | 01    |
| 14    | 14    | 14    | 14    | 14    |
| 829   | 829   | 829   | 829   | 829   |
| 063   | 063   | 063   | 063   | 063   |
| 625   | 625   | 625   | 625   | 625   |
| 5     | 6     | 1     | 3     | 3     |
| 94    | 94    | 94    | 94    | 94    |
| 9125  | 9125  | 9125  | 9125  | 9125  |
| 5 Ra. | 6 Ra. | 1 Ra. | 3 Ra. | 3 Ra. |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| Radix | Radix | Radix | Radix | Radix |

¶ **T**ertius offemus modū inueniendi vtrasq; radices sub vna regula compre-  
hendere scilicet q̄ post primū numerū inuentum scūdus/ vel tertius/ vel  
quartus numerus inueniatur per duplos precedētes multiplicet simul et ta-  
li productū ex illa multiplicatiōe addatur productū ex multiplicatiōe  
ipsius numeri in seipsum taliter q̄ vena huius ponat sub vnitare precedē-  
tis pducti et centena sub vena ita q̄ addat illi vnum limitē ad dexteram  
et illa totalis summa subtrahat ab omnib; figuris quę sunt supra talem  
numerū et supra omnes duplos precedētes et hoc in quadratis. sed in cu-  
bis non solum multiplicat cum triplic precedētibus numerus nouiter in-  
uentus sed compositus ex eo et cum triplic precedētibus in alio non dis-  
fert opus. ¶ Quarta pars docet inuenire residuū radices ex residuo nu-  
meri principalis quando ille non fuit precise quadrat⁹ vel cubicus et mo-  
do sub erit iste accipe illud residuū extra et pro radice quadrata adde ei du-  
as cifras a parte dextra pro radice vero cubica tres cifras et operando



# Arithme. Practi. Algorismi.

eodē modo sicut prius quere illius radicem: qua inuēta multiplica illam per. 60. et ex producto numero tot figuras demerueris ut terā quot fuerant in radice quā multiplicasti et illud quod remanet ostendet quot sexagesime vnius integri debeant addi ad illa integra que sunt in radice primo inuenta.

**¶** Ex dictis in hoc capitulo poterit sciri pro geometria practica quantitas linee o. ametrals vel diagonalis in quadrato vel quadrāgulo quolibet. nam si quantitas cuiuslibet lateris per seipsam quadrate multiplicet et producta inuicem addant et a tota illa summa radix quadrata inueniat illa erit quantitas linee diagonalis quadrāguli: vt patet hic.

**¶** Et ex ista inferet vna regula pro astrologia cosmographia ad inueniendum distantias inter duas ciuitates longitudine et latitudine simul distantes: si enim distantiam earum in longitudine accipiam ex cosmographia per seipsam multiplices quadrate similiter et distantiam latitudinalē ipsarum per seipsam multiplicaueris et productis additis simul si radicem quadratā quæsieris habebis totam distantiam simul in latitudine et longitudine inter eas secundū gradus celi. **¶** Et si velles videre illam distantiam per terrā attendas quod cuiuslibet gradus celi respondet in terra secundū Macrobiū et Eusthenem et Theodosiū. 700. stadia in terra. sed secundū Ptholomeū in cosmographia sua non sunt nisi. 500. per circulum maximū cuius auctoritati est magis standum et hoc communiter sentient omnes moderni. habita ergo distantia ciuitatū in gradibus et minutis intra tabulā sequentem et habebis quot leuce hispanice et quot miliaria et quot stadia illis respondent in terra.

|           |    |    |    |    |     |     |     |      |      |     |   |
|-----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|---|
| gradus    | 1  | 1  | 2  | 3  | 4   | 8   | 16  | 32   | 64   | 128 |   |
| celi      | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1   |   |
| leuce     | 20 | 41 | 62 | 83 | 166 | 333 | 666 | 1333 | 2666 |     |   |
| hispanice | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1   |   |
| miliaria  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1   | 1   | 2   | 1    | 1    | 2   | 1 |
| stadia    | 1  | 4  | 10 | 14 | 10  | 10  | 10  | 10   | 10   | 10  | 1 |

**¶** Tractatus secundus de fractionibus  
physicis habet duo capitula.



Ste tractatus est multum utilis volentibus aliquid scire in eduminationib<sup>9</sup> astrologie et notandū quod in astrologicis tabulis gradus dicuntur integra et signa dicuntur tota: sed minuta secunda et tertia quarta quinta &c. dicuntur fractiones physice: et in hoc primo ponam regulas quattuor de numeratione. deinde quattuor regulas de singulis speciebus algorismi.

**¶** Capitulum primū de regulis numerandi in fractionibus physicis.

b. ff.



# Tractatus

**P**rima ergo regula est si volueris gradus in phisicas fractiones reducere. videas quota sit denotatio illius fractionis et toties multiplica numerum integrorum per. 60. vt si velles vide. 3. gradus quot quinta faciunt multiplica 3 per. 60. quies et inuenies q faciunt. 2332800000. quita. Secunda regula si volueris fractiones grossiores in subtiliores couertere. vide per quot unitati denotatio subtilioris fractionis distat a denotatione grossioris et totiens multiplica numerum grossioris per. 60. vt si vis scire quinta minuta quot quarta sunt multiplica 3. per. 60. ter et inuenies. 1080000. quarta. Tertia regula contraria prime est si velles fractiones aliquas ad integra. s. gradus couertere. vide quota sit denominatio talium fractionum et totiens has diuide per. 60. vt si vis scire. 75821034. tertia quot gradus sunt. diuide primo ista tertia per. 60. et numerus quotiens erunt secunda. et si aliquid significat residuum erunt tertia. iterum numerum illi quotientem diuide per. 60. et numerus quotiens inde proueniens erunt minuta. et si aliquid fuerit residuum erunt secunda. et iterum secundum quotientem diuide per. 60. et numerus quotiens inde proueniens erunt gradus et residuum erunt minuta et sic habebis. 351. gradus. 1. minutum. 23. secunda. 54. tertia. Quarta regula contra secunde si volueris fractiones subtiliores in grossiores couertere. vide per quot unitates distant talium fractionum denominationes. et toties subtiliores diuide per. 60. operando modo dicto in precedenti regula. et hoc modo. 9735000. quarta si reducantur ad minuta erunt 4. 5. minuta. 4. 10. tertia. 0. quarta.

**C**apitulum secundum de quinqz speciebus algorismi quoniam ad fractiones phisicas.

**P**rima regula est de additione. si volueris fractiones phisicas fractionibus phisicis addere et integra integris. non enim est possibile dissimilia dissimilibus addere vt fractiones integris aut diuersas fractiones diuersis nisi prius reducantur ad similia per regulas supradictas. scribe primo per ordinem gradus minuta et secunda etc. quod licet in suo loco per suos limites. nam in qualibet istarum denominationum possunt esse unitas dena deinde sub illis prius scriptis scribe alia que istis vis addere. s. gradus sub gradibus. minuta sub minutis etc. et si iterum volueris addere aliqua alia scribe eodem modo quodlibet sub suo genere taliter q semper integra et fractiones grossiores sint ad sinistram subtiliores ad dexteram. incipe ergo a dextris infractibus subtilioribus hoc modo in limite unitatum adde omnia simul videndo numerum proueniens si sit unitas aut dena aut compositus vt supra dictum est in additione. et subscribe eidem loco quod oportuerit. et serua mente illas denas quas ibi collegisti. et iunge cum figuris sequentis limitis. ei adde omnes figuras secundum limitis eiusdem fractionis et vide summam proueniens. et considera ibi quot senarii integri resultant quia illos debes seruare mente. et subscribe id quod fuerit ultra senarios perfectos. s. quod fuerit minus senario. nam sicut se habebat dena ad primum limitem q non debeat ibi scribi sed ad sequentem limitem transferri mente. Ita in secundo limite nullus senarius pos-

# Arithme. Practi. Algorismi.

test scribi sed ad sequentem limitē transferendum est hoc facto accede ad sequentem fractionē grossiorē et senarios mente seruatos ex precedēte fractione adde vnitatib⁹ illius/ et collige omnes vnitates primi limitis ibidem ⁊ operare penitus eodē modo vt in precedente/ et ita per omnes fractiones quousq; ad gradus puenieris. vbi colligendo gradus ex 50 gradibus facies vnum signū secundū cōmunē vsū: sed secundum tabulas Alfonsi regis etiam operaberis in gradibus sicut in fractionibus precedentibus eo qd vñ signū in eisdem valet. 60. gradus. Et cū peruenieris ad signū si nūerus signorū sit vltra duodecim abice duodecim quotiens poteris et scribe semper numerū minorem duodecim: sed in tabulis Alfonsi nūerus signorum non potest excedere senariū nūerum ideo abice sex quotiens poteris residuū scribendo. Et nota qd eodē modo poteris addere numeros dissimiliū valorum scilicet diuersas monetas/ diuersa pondera: diuersas mensuras/ cōsiderando valores illarū et quot ex minoribus valeat vñ de maioribus et sumādo iuxta illum valorem incipiendo operationē a minoribus a dextris. horum sequuntur exempla.

**Figura secundum tabulas Alfonsi. Practica in monetis.**

| signa | gradus | minuta | secunda | tertia | auri   | argentei | denarij | oboli |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|-------|
| 5     | 47     | 39     | 53      | 15     | ducati | solidi   |         |       |
| 3     | 26     | 54     | 18      | 34     | 12     | 23       | 9       | 4     |
| 2     | 17     | 23     | 45      | 56     | 8      | 16       | 7       | 3     |
| 1     | 31     | 57     | 57      | 45     | 32     | 14       | 11      | 5     |
|       |        |        |         | 53     | 25     | 4        | 0       | 11    |

In tali practica monetarū sex oboli faciunt denariū/ duodecim denarij solidum. 30. solidi argentei ducatu. De duplicatione in fractionib⁹ phisicis non oportet dare regulam specialem sed fiat sicut additio scribendo eūdem numerū bis. Secūda regula est de subtractiōe. si vis subtrahere fractiones a fractiōibus/ aut integra ab integris scribe numeros eodem modo vt in additione. et incipe etiam a dextris primo in vnitatibus fractionis subtilioris et subtrahē primā inferiorē de primā superiore si possit residuum scribēdo sub linea. si autē non possit mutuā vnitatē a sequente limite eiusdē fractionis et adducta illa vnitatē ad primū limitē valebit decem: et tūc subtrahes vt supra dictū est. deinde pcedē ad secundū limitem et subtrahē inferiorē de superiori si possit sin autē mutuā vnitatē a sequente fractiōe/ et adducta ad tuū limitem valebit sex ab eo ergo senario cum illa figura quā habebas subtrahē inferiorē figuram: et tunc procedas ad sequentem fractionem/ ⁊ operare penitus eodem modo vt in precedēte. Hac etiam forma poteris subtrahere in numeris diuersorū valorū scilicet monetis ponderibus et mensuris cōsiderando valorem vnitatis mutuæ. Dimidiatio etiam per hanc regulam poterit praticari. Exempla satis possunt patere per precedētia. Tertia regula est de multiplicatione. Si volueris phisicas fractiones per integra vel per alias fractiones multiplicare. multiplica nūerū integrorū vel fractionū p tales alias frac-



# Tractatus

tionem et numerus qui inde puenit erit eiusdem denominationis cum fractionibus multiplicatis si multiplicasti integra per fractiones vel talis numerus pueniens ex multiplicatione erit denominationis que puenit ex additione quarum denominationum quando multiplicas fractiones per fractiones. exemplum primi si multiplices. 53. minuta per. 12. gradus puenies. 636. minuta. exemplum secundi si multiplices. 45. minuta per. 37. quarta puenient. 1665. quinta et si fuissent. 45. secunda et 37. secunda productus numerus fuisset quarta et si fuissent. 45. tertia et 37. quarta fuisset sexta in numero producto. et si fuissent. 45. tertia et 37. quarta fuisset producta septima &c. Quarta regula est de diuisione si vis fractiones phisicas per integra vel per alias fractiones diuidere: diuide vnum illorum numero rum per alium et numerus quotiens erit eiusdem denominationis cum fractione diuisa si diuisisti fractiones per integra vel e contra si autem diuisisti fractiones p fractiones talis numerus quotiens erit talis denominationis sicut est numerus q remanet subtrahendo denominatione grossioris fractionis a denominatione subtilioris. Et nota q si ex pma diuisione aliqd remanet indiuisz debet multiplicari p. 60. et productum iterum diuidi p idē qd prius Et numerus quotiens erit denominationis minoris immediate sequētis. et si adhuc aliquid fuerit residuum ex secunda diuisione iterum multiplice tur per. 60. et productum iterum diuidatur per idem quod prius et numerus quotiens erit adhuc minoris denominationis immediate sequētis et sic iterum quousqz nichil remaneat si precise multum volueris operari. exemplum primi si diuidas. 253. sexta per. 24. gradus puenient. 10. sexta 30. septima. exemplum secundi si diuiseris. 359. quinta per. 45. tertia erunt. 7. secunda. 58. tertia. 40. quarta et si fuissent. 359. quarta et. 45. tertia numerus quotiens fuisset. 7. minuta. 58. secunda. 40. et tertia si fuissent. 359. sexta et. 45. secunda numerus quotiens habuisset istas denominationes. 7. quarta. 58. quinta. 40. sexta et si fuissent. 359. tertia et. 45. tertia numerus quotiens fuisset. 7. gradus. 58. minuta et. 40. secunda: semp cuz due fractiones sunt eiusdem denominationis numerus quotiens resultas ex diuisione vnus ad aliam erunt gradus et consequēter minuta &c. De radicem ettractione non est aliqua regula specialis in fractionibus phisicis distincta a regulis vatis pro numeris integris similiter neqz de pgressionē eo q ille due species in solo vno numero practicatur nō in duobus vt alie. Et in hoc terminatur quod pposueramus dicere in algosimo de integris et de fractionibus phisicis: Laudes deo omnipotentis.

Additur hic iste casus qui est nimis subtilis.

**S**ūt sex socij qui nesciūt q summā pecuniarū habent omnes simul nec quid vnusquisqz eorum per se seu seipsum habent sed pzm hoc scit q oēs alij quinqz pter ipsum habent. 1630. scuta/et secundus etiam scit q oēs alij pter ipsum habent. 1670. scuta/tertius vero scit q oēs alij pter ipsum habent. 1545. scuta/quintus etiam scit q omnes alij pter ipsum hnt 1655. scuta/sextus scit q omnes alij quinqz pter ipsum habent. 1640. scuta. queritur modo quot scuta vnusquisqz eorum habet/et quot omnes simul ad hoc faciendus: debes summare summas scittas ab ipis sic q erūt



# Arithme. Practi. Algorismi.

summe omniū. 10400. scuta et habes diuidere omnia illa scz. 10400. scuta per. 5. veniet diuisor scz. 2080. et illa summa est q̄ simul om̄es habent et vt videas quot scuta primus habeat subtrahas ab illa sūma scz. 2080. illud quod prim⁹ sciebat q̄ alijs. 5. habebant scz. 1630. et restat seu resultat habet primus: et sic cōsequenter faciendū pro alijs est.


|         |             |                       |            |             |            |     |
|---------|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------|-----|
|         |             | 0040                  | 2080       | 2080        |            |     |
| primus  | 1630 scuta  | 5   10400             | 1630       | 1545        |            |     |
| secūsus | 1960 scuta  | quot oes              | 2080 minus | 450 quartus | 535        |     |
| tertius | 1670 scuta  | siml hñr.             | 2080       | 2080        |            |     |
| quart⁹  | 1545 scuta  | prim⁹ hñ 450 scu.     | 1960       | 1655        |            |     |
| quint⁹  | 1655 scuta  | secūsus 120 scu. sc̄s | 120 quint⁹ | 425         |            |     |
| sextus  | 1940 scuta  | tertius 410 scu.      | 2080       | 2080        |            |     |
|         | 10400 scuta | qu artus              | 535 scu.   | 1670        | 1640       |     |
|         |             | quint⁹                | 425 scu.   | tertius     | 410 sextus | 140 |
|         |             | sextus                | 140 scu.   |             |            |     |

2080 scu.


Ita vt inuenies q̄ primus habebat. 450. scuta/secūdus vero. 120. scuta/tertius autē. 410. scuta/quart⁹. 535. scuta/quint⁹. 425. scuta/sextus. 140. scuta. et si videre velis an ita sit summas omniū excepto primo accipias inueniet illud quod primus dicebat se scire q̄ alijs quinq̄ habebant. scilz 1630. scuta cōformiter et de alijs hoc faciendo comperies.


¶ Arithmetice practice seu Algorismi tractatus a p̄etro sanche Ciruelo nouiter cōpilatus Explicit Impressus p̄darisus per Thomam Rees in domo rubea post Carmelitas. Anno dñi. 1513. Die v̄e ro. 19 Septembris.






















Exempla et similitudines







Exemplar

15

dimittit